

Transmuraal Formularium MIJN.streek
(versie 8-12-2017)

Pijn (paracetamol en NSAID's) in

Paracetamol oraal of rectaal
NSAID

Naproxen oraal rectaal
Ibuprofen oraal
Diclofenac oraal rectaal parenteraal cutaan

Diabetes mellitus II medicamenteuze behandeling.

biguanide: metformine
sulfonylureumderivaat: gliclazide of tolbutamide
insuline-mix Novomix 30/70 of Humuline 30/70 of Humalog 25/75
insuline langwerkend: Humuline NPH of insuline detemir of insuline glargine
insuline snelwerkend: Novorapid of Apidra of Humalog

CVRM hypertensie medicamenteuze behandeling.

thiazide-diureticum: hydrochloorthiazide of chloortalidon

RAS-remmer

ACE: lisinopril of perindopril of enalapril

ARB: losartan of valsartan

betablokker: metoprolol

calciumantagonist: amlodipine of lercanidipine of nifedipine MGA

Hypercholesterolemie medicamenteuze behandeling

statine: simvastatine of atorvastatine of rosuvastatine

lipidenverlagend middel: ezetimibe

UWI zonder tekenen van weefselinvasie ICPC (U70) U71

nitrofurantoinen
fosfomycine
trimethoprim
amoxicilline/clavulaanzuur

UWI met tekenen van weefselinvasie; prostatitis (niet chronisch)* ICPC (U70) U71

ciprofloxacin
amoxicilline/clavulaanzuur
cotrimoxazol

Chlamydia infectie ICPC U72

azitromycine
doxycycline

Infectie van de lagere luchtwegen ICPC R81

amoxicilline
doxycycline
azitromycine

bacteriële conjunctivitis ICPC F70.1

chlooramfenicol oogzalf
chlooramfenicol oogdruppels
~~tetracycline oogzalf 1%~~

allergische conjunctivitis ICPC F71.01

levocabastine oogdruppels
prednisolon 0,5% minim 3-4x 1 druppel, max. drie dagen=3 minims

contact-allergische conjunctivitis ICPC F71.01

fenylefrine oogdruppels
prednisolon 0,5% minim 3-4x 1 druppel, max. drie dagen=3 minims

herpes ICPC F85.01

aciclovir oogzalf

blepharitis squamosa et ulcerosa ICPC F72.1

fusidinezuur ooggel

droge ogen, insufficiënte traanfilm ICPC F99.8

hypromellose oogdruppels of carbomeeoooggel
bij irritatie: vrij van conserveermiddel

lasogen ICPC F79

oxybuprocaine 0,4% minim in principe eenmalig 1-3 druppels door arts in het aangedane oog

corneabeschadigingen ICPC F79

chlooramfenicol oogzalf
chlooramfenicol oogdruppels
ofloxacin oogzalf
fusidine ooggel
~~tetracycline oogzalf~~

episcleritis ICPC F99.5

prednisolon 0,5% minim 3-4x 1 druppel, max. drie dagen=3 minims

otitis externa ICPC H70

zure oordruppels
idem met HC
idem met TA

bij koorts, algemeen ziek zijn, diabetes of immunodeficientie
combineren met
flucloxacilline en zn paracetamol

otitis media ICPC H71.1

Lidocaine oordruppels? FK zegt "nee", liever paracetamol
xylometazoline neusdruppels (wordt door NHG afgeraden bij kinderen)

systemische behandeling:

amoxicilline
bij allergie: cotrimoxazol
bij uitblijven effect: amoxi/clav

zw en allergie: azitromycine of erytromycine

auriculaire schimmelinf:

miconazol
bij acenocoumarol: sulconazol lotion (Myk)?

Alle vier de DOAC's zijn in het Formularium MIJN.streek opgenomen bij atrium fibrilleren, omdat de NHG-standaard ze recent gelijkgesteld heeft met de vitamine K antagonist en omdat we in overleg met de cardiologen een keuze voor een of twee van de vier (nu nog) niet te verdedigen vinden. Het advies aan de huisartsen die ze willen voorschrijven, is om er eentje te kiezen en daarmee zoveel mogelijk ervaring op te doen en deze, waar de noodzaak daartoe zich aandient, te delen op de website van Lareb.

Foliumzuur suppletie kinderwens A97

0,5 mg als er geen neuralebuisdefect in de voorgeschiedenis is en 5 mg als die er wel is geweest.